observation

Sur une cure obtenüe par Le retranchement de La partie inferieure Du tibia ; Dans La Luxation Du pied.

par mr. Davy chevrie maitre En chirurgie à Sablé.

Le 15 mai 1786. La veuve guiard agée de 40 ans, paroisse De Boüerre, province du maine, Se trouva Le pied Engagé Sous une racinne darbre en Descendant un terrein très incliné, ce qui La fit tomber, Le pied retenu par cette ~~racinne~~ Entrave ; et il Se fit une Luxation complette En dedans, avec rupture, des Ligaments, De la capsule articulaire et même de la peau et Le tibia passant a travers Les teguments : Elle Etoit Seule Lors de Sa chute, et fit dans cet Etat, a Laide D'un Baton, une grande demie Lieüe pour Se rendre chez Elle et perdit Beaucoup De Sang par la plaie y Etant rendüe Son chirurgien ayant reduit La Luxation, apliqué un bandage &a. Les accideants ne tarderrent pas a Se manifester Le Septieme jour, Les convulsions, Lodeur cada-vereuse du pied, et La mort prochaine de la malade, a qui on fit administrer Les Sacrements de Lextreme onction, Determinerrent Le chirurgien et Les parents a me faire appeller ; Lappareil Levé, La premierre chose que je vis, fut Lextré-

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 41 n° 28

-mité inférieure Du tibia, a nud, passant a
travers la peau, la Substeance cartilagineuse
et Spongieuse vers son extremité, desja
detruite et ulcerée dans quelques point, ayant
porté mon doit dans l'articulation sur l'astra
gal il ne m'en falut pas davantage pour
reconnoitre le desordre: l'enorme gonflement
Du pied, et d'une partie de la jambe, accompa
gné d'une très grande douleur; ne me permirent
pour cette premiere visite que de legeres
tantatives, pour faire la reduction, ne pouvant
l'obtenir, j'employai les cataplasme de mie
de pain avec le lait, le bandage a dix huit
chefs, et par cette conduite il se fit une detente
de la diminution du côté du gonflement
j'en profitai pour faire la reduction, et
elle se fit; mais la difficulté etoit de la
maintenir reduite, et quelques moyens que
j'employasse pour maintenir le tibia quarement
avec l'astragal, c'est que je trouvois toujours
a chaque pensement l'extremité inferieure du
tibia entierement passant a travers les teguments, comme
je l'avois observé les autres fois precedantes;
enfin apres avoir medité sur le parti que
je devois prendre en pareille circonsteance
je pris celui de retrancher avec la scie la portion
de tibia servant a l'articulation du pied;
cette section faite laissa un vuide communi
quant dans l'articulation, mais que j'effaçai

Sur Le champ en maintenant Le pied dans un etat de flextion, de maniere ~~tell~~ que Lastragal corespondoit de pres avec Lextremité du tibia, De facon a favoriser La coaptation, ou reunion des parties, La plaie couverte d'un plumaceau ou charpie molette Sans aucun medicament ni tamponage, Le tout couvert des cataplasmes cy dessus, abbandonnant Le reste aux Loix de la nature, jobtint par cette conduite une reunion parfaite dans Lespace de deux mois et demie, Sans Exfoliation (Du moins Si elle Sest faite je ne m'en suis point apercu) ni aboudante Supuration; il nest pas même reste de douleur; quand elle marche beaucoup et sans Laide d'un Baton*: il ny a point de tumefaction dans Le pied et La jambe, La claudication est très peu Sensible, Les chauss ures qui Lui servoient avant Laccident, elle Les a usée après etre guerie, quand elle a commencé a marcher: une Bonne et ferme cicatrice, qui ne Sest jamais rouverte, et de La Largeur de deux Lignes, prenant En circonfereance vers Le colet du pied, et aboutissant a un pouce du tendon dachile, est Le Seul vestige, a cela pres de La Legerre claudication qui Laisse voir La Solution de continuité qui a Eté faite pour La Section Du tibia.

* Elle ne Sen Sert absolument point pour marcher.